

EAST SIDE ENDOSCOPY
380 2nd Avenue (@22nd ST)
Concourse A
New York, NY 10010

BETH ISRAEL MEDICAL CENTER
16th Street and 1st Avenue
Endoscopy: 8 Dazian
New York, NY 10003

Instrucciones para la endoscopia digestiva alta (EGD) y la ecografía endoscópica (EUS)

- Por favor, deje de tomar aspirina o medicamentos antiinflamatorios (como Advil, Motrin, Naprosn, etc) 5 días antes de su procedimiento endoscópico. Si usted está en el Coumadin o medicamentos para el otro adelgazamiento, hable con su médico antes del procedimiento
- Si usted es diabético, por favor, discuta sus medicamentos para la diabetes con su médico antes del procedimiento.
- Si el procedimiento es antes de las 12 del mediodía, no tienen ningún alimento sólido después de la medianoche la noche antes de su procedimiento.
- Si su cita es después de las 12 horas, usted puede tener una luz (baja grasa, fibra de baja) el desayuno por lo menos 6 horas antes de su procedimiento, entonces nada por vía oral, incluidos los líquidos.
- Usted puede tomar la medicación necesaria con sorbos de agua.
- Usted debe tener una escolta ayudar a llevarte a casa. La conducción no se permite por lo menos 24 horas, debido a la somnolencia y reflejos retardados de la medicación intravenosa. Además, no debería llevar a cabo cualquier tipo de negocio o firmar cualquier documento legal hasta el día siguiente.